



Neu von medac - Antikörper

Varizella Zoster Virus (VZV) (SG1-1, SG1-SG4, NCP-1 & IE-62)

Das Varizella Zoster Virus (VZV) gehört zur Familie der humanen Herpes-Viren und ist Erreger von Windpocken (Varizellen) und Gürtelrose (Herpes zoster). Die Primärinfektion mit dem Virus löst häufig die Windpocken aus, die meist ohne Komplikationen verlaufen. Obwohl anschließend keine klinischen Symptome der VZV-Infektion mehr nachweisbar sind, persistiert das Virus oft im Nervensystem des infizierten Patienten. In ca. 10-20% der Fälle wird das Virus reaktiviert und löst dann den Herpes Zoster aus. Diese Erkrankung kann ernste Komplikationen wie post-herpetische Neuralgie, Zoster multplex, Myelitis, Zoster ophthalmicus oder Zoster sine herpette zur Folge haben.

VZV ist eng mit dem Herpes simplex Virus (HSV) verwandt. Das betroffene Hautareal weist viele histologische Ähnlichkeiten auf, die eine Unterscheidung zwischen VZV und HSV schwierig machen. **Der VZV-Antikörper ist daher ein neuer spezifischer Marker zur Differenzierung zwischen HSV und VZV.**

Bestell-Information VZV (Maus Cocktail monoklonal)

verfügbare Größen:

0,1 ml konzentriert
0,5 ml konzentriert
1,0 ml konzentriert
1,0 ml gebrauchsfertig
7,0 ml gebrauchsfertig
5 Positivkontrollschnitte

Kat.-Nr.

364M-14
364M-15
364M-16
364M-17
364M-18
364S

Tel. 04103/8006-111

IVD CE

Referenzen:

Kleinschmidt D, *et al.*, J Neurol Sci, 1998 Aug 14; 159(2):213-8.
Kaye SB, *et al.*, Br J Ophthalmol, 2000 Jun;84(6):563-71
Nikkels AF, *et al.*, Virchows Archiv A pathol Anat, 1993; 422:121-126